



# FIOTRYL TABLETAS

Antibiótico de amplio espectro

Reg. SADER Q-0060-076

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

## FORMULA

Cada tableta contiene:

Enrofloxacin clorhidrato	50 mg.
equivalente a enrofloxacin	
Excipiente, c.b.p.	1 tableta

## DOSIS

Ovinos: 1 tableta por cada 20 kg de peso, cada 24 horas, durante 5 días consecutivos.  
 Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 10 kg de peso, cada 24 horas, durante 5 días consecutivos.  
 Aves (pollos de engorda, pollas de reemplazo y pavos): tableta por cada 2.5 kg de peso, cada 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos.  
 Conejos: 1 tableta por cada 10 kg de peso, cada 24 horas, durante 5 días consecutivos. Para todos los casos en enfermedades causadas por salmonelosis y problemas bacterianos intracelulares se recomienda el tratamiento por 7 días. En caso de infecciones crónicas o persistentes La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

## FORMA FARMACÉUTICA

Tabletas

## DESCRIPCIÓN

Antibiótico de amplio espectro derivado de la fluoroquinolona, contra gérmenes Gram-Positivos, Gram-Negativos, Pseudomonas y micoplasma.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

## INDICACIONES

Fiotryl tabletas contiene un antibiótico de amplio espectro de 3° generación, de acción inmediata que actúa inhibiendo la topoisomerasa bacteriana de gérmenes gram-positivos, gram-negativos, Pseudomonas y Micoplasmas. Indicado en el tratamiento y control de enfermedades bacterianas y micoplasmáticas locales y sistémicas en vías respiratorias, tracto gastrointestinal, vías urinarias o de la piel; en Ovinos, Caprinos, Caninos, felinos y Aves. Tales como: Colibacilosis, Salmonelosis, Clostridiasis, Leptospirosis, neumonía, bronconeumonía, dermatitis bacteriana, piodermitis, osteomielitis, pastereelosis y enfermedades ocasionadas por *Staphylococcus aureus*, *Erysipelotryx*, *Clostridium perfringens* y las causadas por Pseudomonas y micoplasmas. En conejos es útil para el tratamiento de septicemia causada por *Pasteurella multocida*.

La enrofloxacin no presenta efecto inmunosupresor ni interfiere con la respuesta postvacunal, no genera resistencia mediada por plásmidos y no posee resistencia cruzada con otros fármacos.

## ADVERTENCIAS

Puede presentarse vómito ligero en animales hipersensibles a la fórmula, en el caso, suspender el tratamiento. No suministre el producto en animales durante la fase de crecimiento rápido, en perros menores de 1 año y gatos menores de 8 meses. No administrar en animales en caso de que presenten trastornos de crecimiento del cartilago. No utilizar en animales con afecciones del sistema nervioso central. No utilizar en animales gestantes o lactantes. Deben tomarse precauciones cuando se administra simultáneamente con fenacetina, fenotiazinas y warfarina, ya que la enrofloxacin causa inhibición de las enzimas hepáticas que metabolizan estos fármacos. La baja estabilidad de las fluoroquinolonas en orina ácida puede causar cristaluria renal en animales que no estén hidratados adecuadamente. No se debe usar este producto 5 días antes del sacrificio de animales

## PRECAUCIONES

No administrar medicamentos a base de aluminio o magnesio (antiácidos), dentro de las 2 horas posteriores a la toma de Fiotryl tabletas. Conservar el producto en un lugar fresco y seco.

## PRESENTACIONES

Caja con 10 y 100 tabletas

## USO EN:



al servicio de la Salud Animal

Contacto: [ventas@labfiori.com](mailto:ventas@labfiori.com) | [www.labfiori.com](http://www.labfiori.com) | Tel. 442.2252461 y 442.2252471