

# FLORMAXICOL INYECTABLE

celebramos  
**55** años  
1967-2022

**FIORI**  
PRODUCTOS VETERINARIOS  
al servicio de la Salud Animal

Antibiótico de amplio espectro

## FORMULA

Cada ml contiene:

Florfenicol	300 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml.

Reg. SADER Q-0060-020

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

## FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

## DESCRIPCIÓN

Antimicrobiano de amplio espectro del grupo de los fenicoles.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

**Bovinos:** Intramuscular de preferencia en la zona del cuello, o subcutánea.

**Porcinos:** Intramuscular.

## INDICACIONES

Antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por microorganismos susceptibles al Florfenicol, en Bovinos: contra infecciones respiratorias causadas por *Pasterella hemolítica*, *Pasterela multosida*, *Haemophilus sumnus*. Pododermatitis bovina (gabarro) asociada con microorganismos susceptibles, *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.

En Cerdos: Para el tratamiento de trastornos respiratorios y entéricos *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp.*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Streptococcus suis*. Posee efectiva distribución plasmática, margen de seguridad y resistencia a la inactivación enzimática bacteriana. No induce aplasia medular

## ADVERTENCIAS

No aplicar a bovinos menores de 1 mes de edad o lactantes. No aplicar a vacas lecheras en producción ya que puede haber residuos en leche. No administrar a hembras gestantes. No administrar a machos destinados a la reproducción ya que puede ocasionar atrofia del tejido tubular testicular. No emplear el fármaco en animales hipersensibles al Florfenicol. No deberá consumir la carne de los animales tratados con este producto hasta 28 días después de su última aplicación. No deberá consumir la leche de los animales tratados con este producto hasta 5 días después de su última aplicación. Puede tornarse la solución de transparente a amarilla sin que esto afecte su potencia terapéutica.

## PRECAUCIONES

Almacene a temperatura ambiente. Protegido de la luz y el calor. La solución puede variar de transparente a amarillo claro o amarillo paja; esta variación en color no afecta la potencia terapéutica del antibiótico. No administrar más de 10 ml en el mismo sitio de inyección. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa, ya que el producto es irritante.

## PRESENTACIONES

Frasco con 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.

## USO EN:



## DOSIS

**Bovinos:** 20 mg por kg de peso equivalente a 1 ml por cada 15 kg de peso. Se recomienda administrar un total de dos inyecciones con 48 horas de intervalo por vía intramuscular, o subcutánea 1ml por cada 7.5 kg de peso, como dosis única.

**Porcinos:** 15 mg por kg de peso equivalente a 1 ml por cada 20 kg de peso. Se recomienda administrar en total dos inyecciones con 48 horas de intervalo.

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

ANTIBIOTICOS

al servicio de la Salud Animal

Contacto: [ventas@labfiori.com](mailto:ventas@labfiori.com) | [www.labfiori.com](http://www.labfiori.com) | Tel. 442.2252461 y 442.2252471