

# TYLODOX PREMEZCLA



MEDICACIÓN ORAL

Antibiótico de amplio espectro

## FORMULA

Cada 100 g contienen:

Tilosina tartrato	10 g
Doxiciclina hclato	10 g
Excipiente, c.b.p.	100 g

Reg. SADER Q-0060-081

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

## FORMA FARMACÉUTICA

Premezcla, polvo oral.

## DESCRIPCIÓN

Antibacterianos de amplio espectro a base de tilosina y doxiciclina

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida o mezclado con el alimento

## INDICACIONES

TYLODOX es una combinación de tilosina y doxiciclina, antibacterianos de amplio espectro, que actúan de manera aditiva. Efectivo para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias y gastrointestinales causadas por microorganismos susceptibles a la fórmula como: *E. coli*, *Salmonella*,

*Haemophyllus spp*, *Pasteurella spp*, *Bordetella spp*, *Streptococcus spp*, *Camphylobacter* y enérgico sobre todo contra Micoplasmas en: cerdos, aves, becerros, ovinos y caprinos.

Presenta una gran seguridad en su uso y baja o nula capacidad de generación de resistencia

## ADVERTENCIAS

No administrar en animales hipersensibles a la fórmula.

No administrar en animales con daño hepático severo.

No administrar simultáneamente con penicilinas, cefalosporinas y aminoglucósidos.

No administrar a equinos, puede provocar diarrea severa, que puede ser mortal.

No administrar este producto en cerdos 6 días, bovinos, ovinos y caprinos 14 días y aves 7 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano respectivamente.

No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 4 días después de la última aplicación.

No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.

El contacto directo con piel o membranas mucosas durante la mezcla, puede causar irritación a quien lo prepara.

Mantenga el producto en su envase bien tapado, en lugar fresco y seco.

## PRESENTACIONES

Bolsa resellable de 100 g, 1 kg, Cubeta con 10 bolsas resellables de 1 kg

USO EN:



## DOSIS

Aves (pollos de engorda) y Cerdos: Administrar 1 kg de Tyloxox por cada 1000 litros de agua de bebida ó 1 a 2 kg de Tyloxox por cada 1000 kg de alimento, durante 3 a 5 días continuos.

Bovinos, Ovinos y Caprinos: Administrar 10 g de Tyloxox por cada 100 kg de peso, durante 3 a 5 días continuos.

Becerras: Para becerros lactantes de 60 kg a 80 kg de peso, administrar 6 g de Tyloxox por día, a razón de 3 g de Tyloxox en la toma de leche en la mañana y 3 g de Tyloxox en la toma de leche por la tarde, por un periodo de 5 días continuos.

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

*al servicio de la Salud Animal*

Contacto: [ventas@labfiori.com](mailto:ventas@labfiori.com) | [www.labfiori.com](http://www.labfiori.com) | Tel. 442.2252461 y 442.2252471