

ANESTYL

Antibiótico enzimático

FORMULA

Cada ml contiene:

Clorhidrato de Lidocaína 20 mg

Adrenalina 0.005 mg

Agua Inyectable, c.b.p. 1 ml

Reg. SADER Q-0060-071

La venta de este medicamento requiere receta médica cuantificada. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DESCRIPCIÓN

Antibiótico enzimático. Solución acuosa

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea, intramuscular, intrasinovial o infiltración nerviosa

DOSIS

Anestesia local:

Bovinos (engorda): 2 mg/kg equivalente a 0.1 ml/kg

Equinos: 0.6 mg/kg infiltración 0.03 ml/kg
Ovinos y Caprinos: 1 mg/kg equivalente a 0.05 ml/kg

Porcinos: 2 mg/kg equivalente a 0.1 ml/kg
Caninos y Felinos: 1 mg/kg equivalente a 0.05 ml/kg

En las cantidades suficientes para lograr el bloqueo o, a criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES

Como anestésico local se emplea la lidocaína para anestesia infiltrativa y bloqueo de campo, para bloqueo nervioso periférico y para anestesia epidural o caudal y cirugía en pequeñas y grandes especies. Anestésico local de aplicación por infiltración subcutánea, muscular, mucosa, etc. y de la aplicación tópica sobre las mucosas

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS:

No administrar vía intravenosa, intraarticular, epidural o intradigital.

No administre en animales con deficiencia hepática o renal

No administrar en casos de isquemia regional o de hipersensibilidad a la lidocaína o a otros anestésicos locales de tipo amida.

No administre en zonas inflamadas o con infección.

No aplicar junto con depresores de SNC.

No se recomienda durante el primer tercio de gestación

No administre en equinos destinados al consumo humano

No usar este producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

No consumir la leche de los animales tratados con este producto hasta 7 días después de la última aplicación.

Conservar el producto en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIONES

Frasco 50 ml.

USO EN:



al servicio de la Salud Animal