

ESTREPTO BENCIFORTE



Antibiótico de amplio espectro

FORMULA

Cada Millón de U.I. contiene:

El frasco ampula contiene:	1 millón	2 millones	4 millones	6 millones	50 millones
Penicilina G Benzatínica	125,000 U.I.	250,000 U.I.	500,000 U.I.	750,000 U.I.	6,250,000 U.I.
Penicilina G Procaínica	375,000 U.I.	750,000 U.I.	1,500,000 U.I.	2,250,000 U.I.	18,750,000 U.I.
Penicilina G Sodica	500,000 U.I.	1,000,000 U.I.	2,000,000 U.I.	3,000,000 U.I.	25,000,000 U.I.
Estreptomina base (como sulfato)	750 mg	15 mg	3 g	45 g	375 g

El frasco con diluyente estéril contiene:

Dipirona sódica	400 mg	400 mg	800 mg.	12 g.	10 g
Vehículo, c.b.p.	10 ml	10 ml	20 ml	30 ml	250 ml

Reg. SADER Q-0060-030

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo estéril para suspensión Inyectable

DESCRIPCIÓN

Antibiótico enzimático. Solución acuosa

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

DOSIS

20,000 a 40,000 U.I. por kg. de peso.
La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda

INDICACIONES

Antibiótico con niveles hemáticos prolongados, efectivo en numerosas infecciones ocasionadas por bacterias Gram-negativas y Gram-positivas.

PRECAUCIONES

No usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No consumir la leche de animales tratados hasta 21 días posteriores a la última aplicación.

No administrar en aves de postura productor de huevo para plato.

Conservar el producto en un lugar fresco y seco.

Agítese antes de usarse hasta que tome un aspecto homogéneo.

PRESENTACIONES

Frasco con: 1Millón, 2 Millones, 4 Millones, 6 Millones, 50 Millones de U.I.

Diluyente 10 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml 250 ml

USO EN:



al servicio de la Salud Animal