

celebramos
55 años
1967-2022



PRODUCTOS VETERINARIOS

al servicio de la Salud Animal

FIOXONA

Antibiótico de amplio espectro

Reg. SADER Q-0060-072

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMULA

Frasco conteniendo polvo estéril

con Ceftriaxona sódica equivalente a	15 g	7.5 g	10 g	25 g
de Ceftriaxona base				

Cada frasco de diluyente contiene:	20 ml	100 ml	200 ml	500 ml
------------------------------------	-------	--------	--------	--------

Diluyente estéril, c.b.p.

Una vez reconstituido cada ml contiene:

Ceftriaxona sódica equivalente	75 mg
--------------------------------	-------

de Ceftriaxona base

Vehículo, c.b.p.	1 ml
------------------	------

FORMA FARMACÉUTICA

Polvos estéril para reconstituir

DESCRIPCIÓN

Antibiótico de amplio espectro, cefalosporinas de 3^o generación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular e intravenosa

INDICACIONES

Fioxona esta elaborado a base de una cefalosporina de 3^o generación, es un antibiótico de amplio espectro útil para el tratamiento en proceso infeccioso agudo causados por microorganismos sensibles a la Ceftriaxona. Para tratar enfermedades en **Bovinos**: Metritis, fiebre de embarque, gabarro, septicemias, infecciones respiratorias complicadas causadas por *Haemophilus somnus*, *Pasteurella hemolytica*, *Pasteurella spp* y *E. coli*. **Porcinos**: En el tratamiento de enfermedades causadas por *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *S. pneumoniae* y *E. coli* presentes en neumonías y en afecciones de los aparatos digestivo y genito-urinario. **Equinos**: En infecciones por bacterias que causan neumonía, influenza equina complicada, peritonitis, salmonelosis, colibacilosis e infecciones uterinas. **Caninos**: En infecciones respiratorias complicadas, neumonía, infecciones de vías urinarias. **Aves**: Indicado en enfermedades respiratorias y en otras afecciones causadas por *E. coli*, *Pasteurella multocida*, *P. hemolytica*, *Salmonella spp* y *Haemophilus spp*.

ADVERTENCIAS

El uso de antibióticos beta-lactámicos como la Ceftriaxona puede provocar reacciones de hipersensibilidad que van desde prurito, fiebre, diarrea, vómito, hasta anafilaxia. No se deje al alcance de los niños ni de los animales domésticos. No se administre durante el embarazo. No utilice la leche de los animales tratados durante las 48 horas siguientes a la última aplicación. No utilice el producto 48 horas antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No administrar simultáneamente con aminoglucósidos para evitar riesgo de nefrototoxicidad. El polvo consérvese en lugar fresco y seco y protegido de la luz. Una vez reconstituido el producto será estable por 7 días manteniéndolo en refrigeración o 3 días si se conserva a temperatura ambiente.

PRESENTACIONES

Frasco con:	1.5 g	7.5 g	10 g	25 g de Ceftriaxona sódica polvo estéril con
Diluyente	20 ml,	100 ml,	200 ml,	500 ml

USO EN:



al servicio de la Salud Animal

Contacto: ventas@labfiori.com | www.labfiori.com | Tel. 442.2252461 y 442.2252471