



FLORMAXICOL 40%

Antibiótico de amplio espectro

FORMULA

Cada ml contiene:

Florfenicol 400 mg

Vehículo (con Diclofenaco

y Bromhexina HCL), c.b.p 1 ml

Reg. SADER Q-0060-091

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DESCRIPCIÓN

Antimicrobiano de amplio espectro del grupo de los fenicoles.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: Intramuscular de preferencia en la zona del cuello, o subcutánea.

Porcinos: intramuscular.

INDICACIONES

Antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por microorganismos susceptibles al Florfenicol, en infecciones respiratorias en bovinos. Pasterella hemolítica, Pasterella multosida, Haemophilus somnus, así como en Pododermatitis bovina (gabarro) asociada con microorganismos susceptibles (*Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melanogenicus*).

En Cerdos: Indicado para el tratamiento de trastornos respiratorios y entéricos *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp.*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Streptococcus suis*. El Florfenicol posee efectiva distribución plasmática, margen de seguridad y resistencia a la inactivación enzimática bacteriana. No induce aplasia medular.

ADVERTENCIAS

No aplicar a bovinos menores de 1 mes de edad o lactantes. No aplicar a vacas lecheras de 20 meses de edad o más grandes ya que puede haber residuos en leche. No administrar a hembras gestantes. No administrar a machos destinados a la reproducción ya que puede ocasionar atrofia del tejido tubular testicular. No emplear el fármaco en animales hipersensibles al Florfenicol. No deberá consumirse la carne de los animales tratados con este producto hasta 28 días después de su última aplicación. No deberá consumirse la leche de los animales tratados con este producto hasta 5 días después de su última aplicación. Puede tornarse la solución de transparente a amarilla sin que esto afecte su potencia terapéutica.

PRECAUCIONES

Almacene a temperatura ambiente. Protegido de la luz y el calor. La solución puede variar de transparente a amarillo claro o amarillo paja; esta variación en color no afecta la potencia terapéutica del antibiótico. No administrar más de 10 ml en el mismo sitio de inyección. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa, ya que el producto es irritante.

PRESENTACIONES

Frasco con 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml

USO EN:



DOSIS

Bovinos (engorda): 20 mg por kg de peso equivalente a 1 ml por cada 20 kg de peso. Se recomienda administrar un total de dos inyecciones con 48 horas de intervalo por vía intramuscular, o subcutánea 1 ml por cada 10 kg de peso, (40 mg/kg) por vía subcutánea como dosis única.

Porcinos (engorda): 15 mg por kg de peso equivalente a 1 ml por cada 25 a 30 kg de peso. Se recomienda administrar un total de dos inyecciones con 48 horas de intervalo.

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

al servicio de la Salud Animal

Contacto: ventas@labfiori.com | www.labfiori.com | Tel. 442.2252461 y 442.2252471