



PRODUCTOS VETERINARIOS  
al servicio de la Salud Animal

# GENTAM-F

Antibiótico de amplio espectro. Para tratamiento de procesos infecciosos producidos por gérmenes gram-positivos y gram-negativos

Reg. SADER Q-0060-052

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

## FORMULA

Cada ml contiene:

Sulfato de gentamicina equivalente a	10 g
de Gentamicina base	
Vehículo, c.b.p.	100 ml

## DESCRIPCIÓN

Antibiótico aminoglucoídos de amplio espectro a base de Gentamicina que puede administrarse por diferentes vías.

## FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, intravenosa, intrauterina e intramamaria.

## DOSIS

- Infecciones intestinales y genitourinarias:** 2 ml. por cada 50 kg. de peso (4 mg/kg/día) durante 3 a 5 días.
- Infecciones respiratorias y septicemia:** 1 ml por cada 20 kg. (5 mg/kg/día) de peso, vía intramuscular durante 3 a 5 días.
- Infecciones genitales en Vacas:** Diluir 2 a 10 ml. de GENTAM-F en 10 a 80 ml. de SUERO FISIOLÓGICO FIORI y aplicar vía intrauterina.
- Infecciones genitales en Yeguas:** Aplicar 5 a 25 ml. vía intrauterina durante 3 a 5 días.
- Mastitis:** Diluir 4 a 5 ml de GENTAM-F en 30 ml de SUERO FISIOLÓGICO FIORI y aplicar con una cánula intramamaria estéril e infundirla en el cuarto afectado.
- En lechones:** Diluir 2.5 ml de GENTAM-F con 47.5 ml de SUERO FISIOLÓGICO FIORI y aplicar 1 ml por cada lechón durante 3 días por vía intramuscular.

**En aves:** Para prevenir las infecciones de los pollos de un día de edad aplicar 0.2 ml intramuscular de la dilución mostrada en la tabla anexa, según la cantidad de pollos por inyectar. La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

Núm. de Pollos	Gentam-F	Suero Fisiológico FIORI
500	1 ml	99 ml
1,000	2 ml	198 ml
2,000	4 ml	396 ml
5,000	10 ml	990 ml
10,000	20 ml	1,980 ml
20,000	40 ml	3,960 ml
50,000	100 ml	9,900 ml

## INDICACIONES

Es muy eficaz en el tratamiento de neumonía, bronquitis, disentería, metritis, infecciones cutáneas, salmonelosis y todas las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Gentamicina.

## ADVERTENCIAS

No debe usarse este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano. No usar en perros con insuficiencia renal. No se administre este producto a equinos destinados para el consumo humano. No deje al alcance de niños y animales domésticos.

## PRECAUCIONES

Conservar el producto en un lugar fresco y seco.

## PRESENTACIONES

Frasco con 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml

## USO EN:



al servicio de la Salud Animal